



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Oxy-T

Deri Antibakteriyeli
Sprey



ALIVIRA

BİLEŞİMİ:

200 ml'lik alüminyum şişede bulunan mavi renkli süspansiyonun her ml'si;
34,74 mg Oksitetrasiklin'e eşdeğer 37,50 mg Oksitetrasiklin HCl içerir. Renklendirici madde olarak 2,0 mg Solvent Blue 45 içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakodinamik özellikleri: Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup çoğu gram pozitif, gram negatif ve anaerob bakterilere karşı etkinlik gösterir.

Farmakokinetik özellikleri: Oksitetrasiklin deriden emilmediği için topikal olarak etkir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Siğir, koyun, keçi, at ve tavşanlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen deri, meme, tırnak enfeksiyonları ve yaralanmalarda tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Uygulanacak bölge tamamen temizlendikten sonra 15-20 cm uzaklıktan enfekte bölge üzerine püskürtülerek uygulanır. Günde 1-2 uygulama yapılır.
İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.
Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.
Sadece topikal uygulama içindir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Aşırı duyarlı hayvanlarda geçici bir lokal duyarlılık görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Gerekli değildir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Tetrasiklinlere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Göze uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.



UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Yanıcı olduğundan, uygulama sırasında sigara içilmemelidir.
Ateşe ve sıcak maddelere doğru püskürtmeyiniz.
Tamamen boşalttıktan sonra uygun şekilde imha edilmelidir.
Boş kutular ateşe atılmamalı ve zorla açılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, güneş ışığından korunarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır. Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

200 ml'lik alüminyum tüplerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.03.2005

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 30.12.2004- 14/029

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

TOPKİM-Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

