



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Masticure

Sağmal Dönem
Meme İçİ Antibakteriyel Merhem



ALIVIRA

BİLEŞİMİ:

Beyaz-sarımsı krem renkli, homojen, yağlı merhem içeren her 10 g'lık enjektör;
200 mg Sefalekssin monohidrat,
100.000 IU Kanamisin monosülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Sefalekssin mastit olgularında sık görülen beta laktamaz üreten Staph. aureus dahil olmak üzere birçok gram pozitif (+) ve gram negatif (-) bakteri üzerinde bakterisid etkiye sahip bir sefalosporindir. Kanamisin ise daha çok gram negatif (-) bakterileri etkileyen bakterisid özellikte bir aminoglikozid antibiyotiktir. E. coli varlığı ile seyreden mastit olgularında spesifik etkinlik göstermektedir. Sefalekssin ve kanamisin kombinasyonu sinerjik etki oluşturmakta ve mastit etkenlerine karşı antibakteriyel etki gücü artmaktadır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Laktasyondaki ineklerde Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ve E.coli kaynaklı mastit tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağlıklı sütü boşaltılmalıdır.

Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.

Meme başı ve memeye masaj yapılarak verilen ilacın yayılmasına yardım edilir.

Uygulama bir sonraki sağımda tekrar edilir. Toplam üç uygulama yapılır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Nadiren deride alerjik reaksiyonlar görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bakteriyostatik antibakteriyeller ile kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Meme dokusunda alerjik belirtiler gözlenebilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler kaybolur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Anırma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra 10 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemeli ve 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:

İlaç kuru dönemdeki hayvanlarda ve sefalosporinlere duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Koyunlarda kullanılmaz.



GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Penisilinlere duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne teması olmamalıdır.

İnsanlardaki penisilin alerjisi halinde yüzde, dudaklarda ve gözlerde şişme ve solunum güçlüğü önemli belirtilerdir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. Güneş ışığından uzakta saklanır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

10 g'lık beyaz opak polietilen enjektörler; 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 09.10.2018

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 10.04.2002 - 11/1030

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

