



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Vitaljek-ADE

Vitamin
Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ:

Açık sarı renkli, steril çözeltinin her 100 ml'si:
Vitamin A palmitat 5 gram (8,5 milyon IU)
Vitamin D3 (kolekalsiferol) 100 mg (4 milyon IU)
Vitamin E (tokoferol asetat) 5 gram (5.000 IU) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Vitamin A protein sentezindeki rolüyle epitel dokunun oluşması, protein anabolizmasının gelişimi, seksüel hormonların sentezi, çeşitli enzimlerin indüksiyonu, çeşitli enfeksiyonlara ve parazitler hastalıklarına karşı direncin artırılmasında önemlidir. Vitamin A verildikten 4 saat sonra plazmada pık yoğunluğa ulaşır ve karaciğerde depolanır. Metabolize olduktan sonra metabolitleri idrar ve gaita ile atılır. Vitamin D3, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında etkili olur. Kalsiyumun sindirim sisteminden emilmesini, kalsiyum ve fosforun kemik dokusundan salınmasını, kemik ve kırıldak dokuda kalsiyumun fikse edilmesini ve kalsiyumun renal ekskresyonunu düzenler. Vitamin D3 alındıktan sonra yağ dokuya bağlanır. Uygulanan dozun %40 kadarı vücudu 10 gün içinde metabolitler halinde safra ile terk eder. Vitamin E, doymamış yağ asitlerinin stabilizasyonunda antioksidan olarak görev alarak biyolojik membranların korunmasında, kas dejenerasyonunun ve hepatik nekrozun önlenmesinde önem taşır. Seksüel fizyolojide gonadotropin üretimi, testis fonksiyonlarının düzenlenmesi ve fetusun gelişinde rol almaktadır. Vitamin E, enjeksiyondan sonra tüm vücut dokularına yayılır. Karaciğer ve kalp dokusunda daha yoğun miktarlarda bulunur. Uygulamadan sonra 1 hafta içinde büyük çoğunluğu safra ile atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

- Sığır, koyun ve keçilerde;
- Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim dönemlerinde artan ihtiyacı karşılanması,
- Çeşitli metabolik olaylarda ve bozukluklarda destekleyici olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sığırlara kas içi, koyun ve keçilere deri altı uygulanır.
Genel farmakolojik doz:
Vitamin A için: 40-60 IU / kg / gün
Vitamin D3 için: 15-30 IU / kg / gün
Vitamin E için: 0,5-1 IU / kg / gün

Pratik doz:
Besi danalarına: 3 ml
Yetişkin sığırlara: 5 ml
Buzağılara doğumdan 1 hafta sonra: 1 ml
Koyun ve keçilere: 1 - 2 ml verilir.
Uygulama ayda bir kere tekrarlanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Gebelikte kullanılır. Önerilen dozlarda içerdiği vitaminlerin kullanımı gebelik yönünden güvenlidir.



ALIVIRA



İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Doz aşımında Vitamin A veya Vitamin D akut toksikasyonuna bağlı belirtiler gözlenebilir. Semptomatik olarak müdahale edilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için 0 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Önerilen dozlarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kedi ve köpeklerde kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Karton kutularda 50, 100 ve 250 ml'lik koyu renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 09.05.2017

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 18.04.2006 - 16/003

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FIRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No:7 Polatlı / Ankara

