



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Antistamin-C

Antihistaminik
Enjeksiyonluk Çözelti



ALIVIRA

BİLEŞİMİ:

Renksiz, berrak, steril çözeltinin her ml'sinde 25 mg Klorfenamin'e eşdeğer Klorfenamin maleat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Klorfenamin alkilamin yapısında bir antihistaminik maddedir. Dokularda histamin H1 reseptör antagonisti olarak etkili olur. Kas içi enjeksiyondan sonra kısa sürede dokulara yayılır ve ortalama 2 saat yarı ömür gösterir. Uygulamadan 1 gün sonra dokularda tespit edilebilir seviyelerin altına iner ve metabolitleri halinde idrarla atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Siğir, at, koyun ve keçilerde:

- Solunum yolları hastalıklarında bronkospazmın çözülmesi ve öksürüğün yatıştırılması amacıyla antibiyotiklerle kombinasyon halinde,
- Ürtiker, alerjik dermatitis, alerjik rinitis ve laminitiste antihistaminik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya damar içi enjekte edilir.

Genel farmakolojik doz: 0,4-0,5 mg / kg c.a.

Pratik olarak 1 ml / 50 kg c.a. verilir.

Uygulama 3-5 gün sürer.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Histaminik maddelerin açığa çıktığı çeşitli metabolik hastalıklarda, spesifik tedaviye paralel olarak damar içi klorfenamin uygulaması tedaviyi destekleyici etki sağlayabilir.

Gebelikte kullanım: Önerilen dozlarda klorfenamin kullanımı gebelik yönünden güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Nadiren aşırı susama belirtileri görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Kortikosteroidlerle kombinasyon halinde kullanılabilir. Hafif sedatif etkisinden dolayı barbitüratlar ve opiyatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Yüksek dozlarda uyuşukluk, hipotansiyon, üriner retensiyon ve görüntü bulanıklığı meydana gelebilir. Uygulama kesilince belirtiler düzeldir. Semptomatik olarak müdahale edilebilir.



GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için kalıntı arınma süresi "0" (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Fonksiyonel hepatik ve renal bozuklukları olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Klorfenamine aşırı hassasiyeti olan hayvanlara uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Karton kutu içerisinde 20 ml ve 50 ml'lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 18.04.2017

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 06.11.2007 - 19/024

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara



P03