

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

SUPRALİVER-1

Enjeksiyonluk Çözelti

Koleretik

BİLEŞİMİ:

Açık sarı veya sarı renkli berrak çözeltinin her ml'si 50 mg Genabilik asit (Menbuton), 250 mg Sorbitol içerir. Antimikrobiyal koruyucu madde olarak 2 mg Klorokrezol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakodinamik özellikleri: Genabilik asitin (menbuton) etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Doğrudan karaciğer parankim hücrelerini uyarıp, normal kompozisyonda ve bol miktarda safra salgısını başlatarak, duodenumda pH ortamını normalleştirmek ve kemoreseptörleri etkilemek suretiyle, reflektör yolla otonom sinir sistemini etkileyerek spazm ve atonilerin çözülmesine, hastalık nedeniyle bozulan peristaltik düzene girmesine, mide - bağırsak ve pankreas salgılarının artmasına yardımcı olduğu tahmin edilmektedir. Anormal içeriğin yer değiştirmesi ve mikroflora ortamının kısmen normalleşmesi, iştihâ, geniş alma ve diğer sindirim aktivitelerinin düzelmesine yardımcı olabilir. Genabilik asit (menbuton), koleretik ve dijestif etkili bir sentetik bileşiktir. Deney hayvanları (rat, kobay, köpek, domuz, keçi, dana) üzerinde yürütülen laboratuvar testleri ile de kanıtlandığı şekilde, safranın kuru madde, safra asidi ve mineral konsantrasyonlarını değiştirmeksizin, safra salgısını 2 - 3 saat süre ile birkaç kat (2 - 9 kat) artırır. Pankreas salgısı miktarını ve tripsin miktarını arttırıcı etkileri daha da belirgindir. Ayrıca, mide salgısını ve pepsin miktarını arttırıcı etkileri de saptanmıştır. Bu etkiler parasempatomimetik nitelikte değildir.

Sorbitol hiperglisemik ve kolagojeniktir. Sorbitolün enerji üretimi amacıyla vücut tarafından kullanılabilmesi için metabolize edilmesi gerekir, bu nedenle enerji alımı gecikir.

Farmakokinetik özellikleri: Sığırlarda intravenöz Menbuton uygulamasından bir saat sonra plazma konsantrasyonu 20 mg/l'ye ulaşır, 8 saat sonra 1 mg/L'nin altına düşer. Farklı türler için eliminasyon yarı ömrünün 8 saat olduğu tahmin edilmektedir. Sorbitol öncelikle karaciğerde fruktoza metabolize edilir. Ayrıca aldoz redüktaz ile doğrudan glikoza metabolize edilebilir. Fruktozemideki artış intravenöz Sorbitol uygulamasının başlamasından hemen sonra gözlenir ve enjeksiyonun bitiminden maksimum 15-30 dakika sonra olur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığırdaki sindirim bozuklukları veya karaciğer yetmezliği sırasında hepato-sindirim aktivitesinin uyarılması amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sığırlarda kas içi ve yavaş damar içi uygulanır.

Ürünün farmakolojik dozu yaşa ve türe bağlı olarak 5 -20 mg/kg Menbuton ve 25 -100 mg/kg Sorbitol şeklindedir. Pratik doz 10 kg vücut ağırlığı başına 1 ml ila 5 ml'dir. Sığır: 30 - 40 ml. Buzağılar: 15-20 ml. Prensipite tek bir tedavi yeterlidir; 24 veya 48 saatlik aralıklarla bir kez tekrarlanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Gebelikte kullanım: İleri gebelik durumunda kullanmayınız.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Enjeksiyon yerinde lokal yangı, nekrotik bir yapı oluşabilir. 20 ml'yi geçmemek koşulu ile derin kas içi uygulama önerilir. Ürün intravenöz olarak uygulandığında göz yaşarması, titreme, idrara çıkma ve dışkılamanın yanı sıra hipersalivasyon da görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Başka ilaçlarla karıştırılarak enjekte edilmemesi tavsiye olunur.

Kalsiyum, prokain penisilin ya da vitamin B kompleksleri ile beraber uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Hızlı ven içi uygulama doz aşımına sebep olur. Tremor, hızlı soluma, spontane dışkılama, öksürme, göz yaşarması, aksırma ve kollaps gözlenebilir.

Kalp blokajı durumlarında kardiyotonik kullanılır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Et ve süt için kalıntı arınma süresi (2) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Yapısındaki fenol nedeni ile kedilere uygulanmaz.

İşitme ile ilgili problemlerde ve safra kanalı tıkanmalarında uygulanmaz.

Kardiyak ve ilerlemiş gebeliği olan hayvanlarda kullanmayın.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Etken maddelere ve/veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla temas etmemelidir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ile iyice yıkayınız. İlaç uygulayan kişinin uygulama bitiminde ellerini ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkamalıdır. Uygulama sırasında bir şey yiyip içilmemelidir. Tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ve artık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobütil tıpalı, 100 ml'lik amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır(VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 03.12.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
27.07.1995 – 08 / 0731

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok NO:66A İç Kapı No:8
Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara