

## Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır  
**Alivira Vitamin-C**  
Enjeksiyonluk Çözelti  
Vitamin

### BİLEŞİMİ:

Açık sarı renkli, berrak, steril çözeltinin her ml'si 250 mg Sodyum askorbat (Vitamin C) içerir. Antioksidan koruyucu madde olarak 2 mg Sodyum Metabisülfite (E223), antimikrobiyal koruyucu madde olarak 15 mg Benzil Alkol (E1519) içerir.

### FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

**Farmakodinamik özellikler:** Sodyum askorbat, hücresel seviyede oksidasyon – redüksiyon işlemlerinde hidrojen taşıyıcısı olarak görev alır. Organizmanın etkilendiği enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, yorgunluk ve bitkinlik gibi çeşitli stres faktörlerinde direncin artırılması, bağışıklık mekanizmasının desteklenmesi ve adaptasyonun sağlanmasında önem taşır.

**Farmakokinetik özellikler:** Parenteral uygulamadan sonra hücre içi de dahil tüm vücuda yayılır. Lökosit ve trombositlerde plazma ve alyuvarlara oranla daha yoğundur. Bezli yapılarda yüksek kas ve yağ dokuda daha düşük oranda bulunur. Sodyum askorbat şeklinde vücuda giren madde dehidroaskorbik asit üzerinden oksalata çevrilir. İdrarla birlikte okzalate halinde atılır.

### KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:

- Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
- Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
- Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

### KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya ven içi kullanılır.

C vitamini farmakolojik dozu 10 ila 250 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz 0.04 ila 1 ml Alivira Vitamin C/kg vücut ağırlığıdır.

Hedef tür başına ortalama:

Yetişkin Sığırlar, atlar: 20 ml

Buzağılar, taylar, koyunlar, keçiler: 10 ml

Köpekler, kediler: 5 ml

Veteriner hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde tekrarlanır.

### ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalate kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

### İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen dozlarda kullanıldığında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

**İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:**

İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Antikoagülan ilaçların mide-bağırsaklardan emilimi azaltır. Ağır metal tuzlarını içeren ilaçlarla geçimsizdir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

**DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:**

Yüksek dozlarda verildiğinde diyare ve ürolitiazise neden olabilir. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

**GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:**

Et ve süt için (0) gündür.

**KONTRENDİKASYONLAR:**

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

**GENEL UYARILAR:**

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız  
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

**UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:**

Etken maddelere ve/veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla temas etmemelidir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ile iyice yıkayınız. İlacı uygulayan kişinin uygulama bitiminde ellerini ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkamalıdır. Uygulama sırasında bir şey yiyip içilmemelidir. Tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:**

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

**KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:**

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

**TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:**

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobutil tıpalı, 100 ml amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:**

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

**PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 02.01.2026****T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.**

29.07.2002-011/1076

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:**

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok  
No:66A İç Kapı No:8 Kartal/İstanbul

**ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:**

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara