



Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CESAMOLİN
Oral Süspansiyon Granülü
Bağırsak Antibakteriyeli + İshal Önleyici

BİLEŞİMİ:

CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü, su veya sütle karıştırıldığında süspansiyon haline gelen, oral yolla kullanılmaya mahsus, beyaz-krem renkli, ince toz bir preparat olup 1 g CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü içinde:

Neomisin sülfat 40 mg
Bizmut subkarbonat 400 mg mevcuttur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Neomisin, aminoglikozit grubundan, geniş spektrumlu bakteriyostatik ve bakterisid etkilere sahip bir antibiyotiktir. Bakterilerin protein sentezini bozmak suretiyle etki yapar.

Neomisin başlıca gram negatif bakterilere (E. coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella spp., Pr. vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp., H. influenza, N. meningitidis, Vibrio cholerae) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staph. aureus, Strep. faecalis) karşı etkilidir.

Klebsiella spp., E. coli, Pseudomonas spp.'lerin duyarlılığı nispeten azdır. Strep. pyogenes, viridans grubu streptokoklar dirençlidir.

Neomisin sülfat, ağız yolu ile verildiğinde bağırsaklardan çok az emilir. Bu sebeple, sistemik antibakteriyel etki yaratmaz. Sindirim kanalında lokalize olan patojenlere etkilidir. Bağırsaklarda önemli ölçüde parçalanmaksızın dışkı ile atılır.

Bizmut subkarbonat, büzüştürücü, antiasit, emici, örtücü bir maddedir. Gastrointestinal kanal içinde aktivite gösterir. Mukoza yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve irkilti yaratan maddelere karşı mukozayı korur. Mukozayı büzüştürür. Böylece, peristaltığı hafifletmek ve sıvı – elektrolit kayıplarını azaltmak suretiyle ishalin durdurulmasına ve gastrointestinal yangıların iyileşmesine yardımcı olur. Sindirim kanalında değişikliğe uğramaksızın dışkı ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Sadece sindirim kanalı ile sınırlı topikal etkilere sahip bir preparat olan CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü at, kedi, köpek, sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindilerde sindirim kanalına lokalize olan neomisine duyarlı patojen bakterileri imha etmek ve ishalin durdurulmasına yardımcı olmak amacı ile kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde su veya sütle karıştırılarak içirmek, tavuk ve hindilerde içme sularına katmak suretiyle kullanılır.

Neomisinin günlük farmakolojik dozu, at - sığır 10 - 20 mg / kg canlı ağırlık, koyun - keçi 10 mg / kg canlı ağırlık, kedi - köpek 10 - 20 mg / kg canlı ağırlık, kanatlılar 10 - 30 mg / kg canlı ağırlıktır. 1 poşet (6 gram) Cesamolın içinde 240 mg neomisin mevcuttur. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıda belirtilen günlük dozlar iki veya üçe bölünerek 8 - 12 saat aralıklarla verilir:

At - sığır (her 100 kg için) : 25 - 50 g / gün (4 - 8 poşet)

Buzağı - tay (her 50 kg için) : 12 - 25 g / gün (2 - 4 poşet)

Koyun - keçi (her 40 kg için) : 10 g / gün (1,5 poşet)

Kuzu - oğlak (her 10 kg için) : 2,5 g / gün (0,5 poşet)

Kedi - köpek (her 4 kg için) : 1 - 2 g / gün (1/6 - 1/3 poşet)

Kanatlılar (100 kg için) : 25 - 75 g / gün (4 - 12 poşet)

CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü normalde 2 - 3 gün kullanılır. Gerektiğinde kullanım süresi uzatılabilir. Ancak, mide – bağırsak mikroflorasının olumsuz etkilenmemesi ve doz aşımına bağlı konstipasyon oluşmaması için aralıksız 5 günden daha uzun bir süre kullanılmaması tavsiye olunur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

CESAMOLİN Oral Süspansiyon Granülü sadece sindirim kanalında etkili olduğundan, enfeksiyon etkenlerinin sindirim kanalı dışındaki organ ve dokularda da lokalize olduğu sistemik enfeksiyonların tedavisinde, ilave olarak sistemik antibakteriyel (veya başka bir sistemik kemoterapötik) uygulanması gerekir.

Aşırı sıvı - elektrolit kaybı sonu şekillenen dehidrasyon hallerinde oral veya parenteral sıvı - elektrolit uygulamaları da yapılmalıdır.

Özellikle doğumdan sonraki ilk 24 - 48 saat boyunca sindirim sisteminin emme yeteneğinin çok iyi olması nedeniyle, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Toleransı geniş ve sistemik etkisi çok düşük olduğu için, tavsiye edilen dozlar ve kullanım süreleri itibariyle istenmeyen yan etkisi yoktur. Tavsiye edilen süreden daha uzun bir süre kullanılması veya tedavi kürlerinin sıklıkla tekrarlanması hallerinde bağırsak mikroflorasının doğal dengesi bozulabilir; sindirim bozuklukları ve konstipasyon gibi yan etkiler oluşabilir. Doz limitlerine uyulmalı ve ardı ardına 5 günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Asit ortamlarda ve yüksek konsantrasyonlarda divalan mineral ihtiva eden ortamlarda neomisin antibakteriyel etkisi azalır. Aminoglikozitler, nöromüsküler blokaj yapıcı etkisi olan, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen ilaçlarla, diğer aminoglikozitler ve furosemid, sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B, polimiksinler ve tetrasiklinler ile birlikte kullanılmamalıdır. Mineral yem katkıları ile bir arada kullanılmamalıdır. Bizmut subkarbonat tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Penisilinler neomisin emilimini azaltabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Doz aşımı halinde konstipasyon (kabızlık) şekillenebilir. Tedavi durdurulur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Sığır, koyun ve keçi sütü için ilaç kalıntı arınma süresi "0" gündür.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Aminoglikozitler böbrek yetmezliği, denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Doğrudan güneş ışığı almayan kuru bir yerde, orijinal ambalajında, 25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

6 gramlık alüminyum folyo poşetler, 10 veya 100 adetlik kutularda ve 75 gramlık plastik şişeler 30 gramlık plastik ölçeklerle karton kutularda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 26.02.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO:
23.01.2003-012/0007

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok NO:66A İç Kapı No:8
Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

AKSU ECZACILIK VE İLAÇ SAN. TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ.
Batı Sitesi Mahallesi, Arif Halıcı Sk. No:36 D:No:32 34 38, 06370 Yenimahalle/Ankara